

Hjemmetransfusjon

Praktisk veiledning

Generelt

Utstyrsesken må oppbevares slik at vann og utstyr ikke blir ødelagt eller at uvedkommende får tak i den.

Bestill mer konsentrat før det er tomt.

Logg behandlingen for rapportering

Oppløsning av konsentrat

Finn fram alt utstyret.

Sitt på et rent, rolig sted.

Ta utstyret ut av eskene.

Vask hendene.

Løs opp konsentratet, følg bruksanvisning i pakken.

Løses det ikke skikkelig opp, skal det ikke brukes!

Trekk opp konsentratet i sprøyten.

Fjern luft.

Strekk ut butterflyslangen en gang

Koble butterflyen til sprøyten.

Fyll butterflyslangen med medisin.

Oppløst konsentrat er minst holdbart i 3 timer, sjekk din medisin.

Stikkingen

Plasser staseslangen ca 10 cm ovenfor valgt innstikksted

Klem sammen vingene på butterflyen for godt grep

Fjern nålebeskyttelsen ved å vri og så trekke den av

Se at åpningen på nålen vender opp

Sjekk at retning på nål og åre stemmer overens

Lett skrå vinkel ved innstikk

Flat ut tilsvarende årens beliggenhet

Før nålen langt nok inn til at den ligger godt forankret i åren, ca halvparten inne

Kontroller backflow/blodsvar.

Dersom du bommer må du ta en ny butterfly! Stikk aldri mer enn en gang med samme nål!

Fiksering er ikke nødvendig, evt. fikser slangen, IKKE over butterflyvingene

Løsne staseslangen

Sprøyt medisinen rolig inn

Legg plaster eller lignende over innstikkstedet og trekk butterflyen ut

Komprimer (press mot innstikkstedet), 3-5 minutter, men IKKE før ETTER at nålen er ute!

*Danner det seg en liten kul ved innstikkstedet betyr det at konsentratet går utenfor åren. Stopp med en gang og avslutt som beskrevet nedenfor under “Avslutning”. Trekk konsentratet som er i slangen tilbake i sprøyten. **(IKKE hvis det er blodtilblandet!)** Ta av butterflyen uten å berøre enden på sprøyten. Ta en ny butterfly, koble den til sprøyten, fyll slangen og prøv på nytt i en ny åre.*

Avslutning

Legg en bomullsdott eller lignende over innstikkstedet.
Trekk nålen rolig ut.
Trykk mot innstikkstedet noen minutter.

Opprydding

Pakk alt utstyret tilbake i esken slik at ingen kan stikke seg på noe av det.
Tape esken godt igjen.
Kastes i vanlig søppel.

Logg behandlingen for rapportering!

Behandlingsveiledning

Blødninger du selv kan ta ansvar for:

Vanlige leddblødninger
Vanlige muskelblødninger *unntatt* psoasmuskelen (nederst i magen)
Kortvarige nese- og munnblødninger
Små sår som ikke må syes
Blod i urin: Drikk mye (2-3 liter), ta det med ro.
 *Bruk **IKKE** Cyklokapron tabletter!*

Står du på forebyggende behandling, skal blødninger som oppstår likevel behandles.

Blødninger sykehuset skal ha ansvaret for:

Muskelblødninger som ikke blir bedre etter 1-2 behandlinger, inkludert psoasmuskelen
Alle sår som må syes
Langvarige blødninger i nese og munn
Blødninger i svelg og hals
Hjernerystelse og bevisstløshet
Blodig oppkast og blodig avføring

Ved hjernerystelse/bevisstløshet og blodig oppkast/avføring settes en dobbel dose mens man venter på transport til sykehus!

SG, februar 2018

Revidert november 2025 Synne Hole