

Scoringsprosedyre for Kjernespørsmålene

Spørsmålene 2-7 inngår i en samlescore: COMI index (range 0-10) som beregnes på følgende måte:

Spørsmål 2a og 2b: høyeste verdi/score av de to spørsmålene.

Spørsmålene 3, 4 og 5: tallet ved svaret angitt av pasienten transformeres til en 0-10 skala etter følgende formel: angitt svar (tall) – 1 x 2.5.

Spørsmålene 6 og 7: Regn først ut gjennomsnittet av disse to svarene, deretter anvendes samme formel som for spørsmålene 3-5 for transformasjon til skala 0-10.

Til slutt beregnes gjennomsnittet av de fem verdiene som fremkommer (=COMI index).

Eksempel:

	Pasientens svar/score	COMI index
2a Korsryggsmerte	4.5	Verdi til COMI index: 4.5 (høyest av de to svarene)
2b Bensmerte	3.0	
3 Funksjon	3	$(3-1) \times 2.5 = 5$
4 Symptomspecifikk livskvalitet	5	$(5-1) \times 2.5 = 10$
5 Generell livskvalitet	4	$(4-1) \times 2.5 = 7.5$
6 Aktivitetsbegrensninger sosialt	1	Gjennomsnitt = 2.5 $(2.5-1) \times 2.5 = 3.75$
7 Aktivitetsbegrensninger arbeid	4	
COMI index		6.15